

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LIPIDOSIS

ADJUNTAR ESTA PLANILLA COMPLETA CON EL ENVIO DE MUESTRAS

Nombre del paciente:

Fecha de nacimiento: DNI:

Nombre del médico:

E-mail:.....

Lugar de trabajo:

Teléfono.....

CUESTIONARIO DE ORIENTACIÓN PARA LA SOSPECHA CLÍNICA DE LIPIDOSIS

(marcar con un círculo por SÍ o por NO)

MANIFESTACIONES CLINICAS		
Anemia	SÍ	NO
Hepatomegalia	SÍ	NO
Esplenomegalia	SÍ	NO
Trombopenia	SÍ	NO
Problemas óseos	SÍ	NO
Ictericia neonatal prolongada	SÍ	NO
Hidrops fetalís	SÍ	NO
Parálisis supranuclear de mirada	SÍ	NO
Transaminasas elevadas	SÍ	NO
Colesterol total elevado	SÍ	NO
HDL disminuido	SÍ	NO
LDL elevado	SÍ	NO
Triglicéridos elevados	SÍ	NO
Esteatosis hepática no alcohólica	SÍ	NO
Esteatosis hepática microvesicular	SÍ	NO
Obesidad	SÍ	NO
Hígado graso	SÍ	NO
Insuficiencia hepática	SÍ	NO
Calcificación suprarrenal	SÍ	NO
Esteatorrea	SÍ	NO
SOSPECHA CLÍNICA DE:		
Enfermedad de Gaucher	SÍ	NO
Niemann Pick A/B	SÍ	NO
Niemann Pick C	SÍ	NO
Deficiencia de Lipasa ácida lisosomal (Wolman/CESD)	SÍ	NO